

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

Гексигин-М®

СОСТАВ:

действующее вещество: хлоргексидина глюконат;
1 пессарий содержит хлоргексидина глюконата (20%) 85,2 мг, в пересчете на 100% хлоргексидин 16 мг; *вспомогательные вещества:* макрогол 1500, макрогол 400.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА. Пессарии.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: пессарии белого или белого с желтоватым оттенком цвета, допускается мраморность поверхности. На срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА. Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии. Код АТХ G01A X.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.

Фармакодинамика. Хлоргексидина глюконат оказывает быстрое и выраженное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии: *Treponema pallidum*, *Chlamidia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*. К препарату слабо чувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.* Не чувствительны к препарату кислотостойкие формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы.

Фармакокинетика. При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.

КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ПОКАЗАНИЯ. Для профилактики венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз) и инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями). Для лечения бактериального вагиноза, кольпита, эрозии шейки матки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. Хлоргексидин нельзя применять вместе с детергентами, которые содержат анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), а также с мылом. Присутствие мыла может инактивировать хлоргексидин, поэтому перед применением препарата остатки мыла необходимо тщательно смыть. Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость суппозитория, ведь препарат применяется интравагинально. Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

Попадание гипохлоритных отбеливающих веществ на ткани, ранее находившихся в контакте с препаратом, который содержит хлоргексидин, может способствовать появлению коричневых пятен на ткани.

Применение в период беременности или кормления грудью. Не противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.

Лекарственное средство применяют интравагинально. Перед применением pessарий освобождают от контурной упаковки. Лечение: применяют по 1 pessарию 1–2 раза в сутки в течение 7–10 дней в зависимости от характера заболевания. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Профилактика венерических заболеваний: применяют однократно по 1 pessарию не позднее чем через 2 часа после полового акта.

Беременность. Учитывая степень выраженности инфекционного процесса, данные бактериологических исследований, явления угрозы прерывания беременности, препарат применяют по 1 pessарию 1 или 2 раза в день в качестве монотерапии или в составе комплексной терапии. Длительность применения – от 5 до 10 дней.

При кормлении грудью препарат применяют в обычных рекомендованных дозах.

Дети. Препарат не применяют детям.

Передозировки. Передозировка и токсические эффекты при применении препарата не выявлены.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ.

Возможны аллергические реакции, зуд в месте введения pessария. Возможны жжение и раздражение в месте введения pessария.

СРОК ГОДНОСТИ.

2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА. По 5 pessариев в стрипе из пленки поливинилхлоридной. 2 стрипа в пачке из картона.

КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА. Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. ПАО «Монфарм».

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И АДРЕС МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Украина, 19100, Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Заводская, 8.