

КОЛЬПОФЛОР суппозитории вагин. №12

Состав

1 суппозиторий содержит:

- *Активные вещества:*
Lactobacillus acidophilus 3x10⁶, Lactobacillus crispatus 5x10⁶, Lactobacillus rhamnosus 5x10⁶, Lactobacillus vaginalis 5x10⁶, молочная кислота 100 мг (мг)
- *Вспомогательные вещества:*

гидрогенизированные триглицериды, воск пчелиный.

Свойства

Суппозитории Кольпофлор восстанавливают здоровый вагинальный биоценоз и предотвращают размножение и развитие патогенных микроорганизмов, восстанавливают естественную кислую среду во влагалище (рН 3,8-4,5) и усиливают сопротивление слизистой оболочки против патогенных микробов.

Бактерии, входящие в состав средства, представляют собой живые лактобациллы, которые часто встречаются в нормальной микрофлоре и идентичны естественной микробиоте. Лактобациллы, входящие в состав средства, за счет выработки особых веществ - бактериоцинов, оказывают антагонистическое влияние на широкий спектр патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Лактобациллы выполняют во влагалище защитную функцию за счет создания кислой рН внутренней среды, которая является неблагоприятной для развития и размножения патогенных микроорганизмов, и способны успешно колонизировать урогенитальную зону вытесняя при этом патогенную микрофлору.

Молочная кислота, которая входит в состав средства, расщепляет патологическую биопленку, состоящую из микробных ассоциаций, увеличивает влияние антибактериальных веществ и создает условия для развития нормальной микрофлоры влагалища.

Рекомендации по применению

Суппозитории Кольпофлор рекомендуется применять в качестве поддерживающего средства при состояниях, характеризующихся нарушением микрофлоры влагалища (бактериальный вагиноз, вагинальный дисбиоз, вагинальный кандидоз, гормонозависимый и неспецифический кольпит, специфический и неспецифический вагинит, гонорея, хламидиоз, микоплазмоз, трихомоноз и т.д.), и как профилактическое средство после гинекологических вмешательств, использования тампонов, местных контрацептивов и при несоблюдении гигиенических норм.

Способ применения и дозы

До и после применения суппозитория соблюдать правила личной гигиены: вымыть руки.

Суппозитории Кольпофлор применять 1-2 раза в сутки (утром и/или вечером перед сном).

Суппозиторий освободить от стрипа непосредственно перед применением и ввести глубоко во влагалище в положении лежа на спине, согнув ноги. Суппозиторий не следует резать или ломать на части. Длительность применения составляет 6-12 дней.

Особенности по применению

Не глотать. Избегать попадания в глаза. Во время беременности и в период лактации использовать после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность (аллергия) к любому компоненту средства.

Форма выпуска

Суппозитории вагинальные. По 6 суппозитория в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С.

Производитель

CYDONIA D.O.O., 75320, Lipa str. 73, Gracanica, Bosnia and Herzegovina.

ЦИДОНИЯ Д.О.О., 75320, ул. Липа, 73, Грачаница, Босния и Герцеговина.