

## Засіб профілактично-гігієнічний

### САНГВІРІСЕПТ

**Склад:** екстракт трави маклеї, етанол 96 %, вода очищена.

**Функціональні властивості.** Алкалоїди трави маклеї серцеподібної (*Macleaya cordata* (Willd.) R.Br.) та маклеї дрібноплодної (*Macleaya microcarpa* (Maxim.) Fedde) родини макових (*Papaveraceae*) проявляють високу антимікробну активність та діють на грампозитивні та грамнегативні бактерії, дріжджоподібні та міцелярні гриби. В основі механізму антимікробної активності засобу лежить пригнічення бактеріальної нуклеази, порушення процесів проникності стінок клітини, перегородок ділення, будови нуклеотиду.

**Рекомендації по застосуванню.** Сангвірісепт чинить протимікробну дію, протигрибкову дію, включаючи *Candida albicans*, та полегшує стани, які супроводжуються інфекційним запаленням: ураження слизової оболонки порожнини рота - при парадонтиті, афтозному стоматиті, виразково-некротичному гінгівостоматиті. Також можливе застосування при ангіні, захворюваннях середнього вуха та зовнішнього слухового проходу; у хірургії – при інфікованих опіках, ранах, що довго не загоюються, і виразках; у гінекології – при ендоцервіциті, кольпіті, вагініті, ерозії шийки матки; в дерматології – при піодерміях, поверхневих бластомікозах, дерматомікозах.

Як профілактичний засіб: для запобігання гнійно-запальних захворювань шкіри та слизових оболонок, а також для профілактики ранової інфекції.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів, грибкові ураження з явищами екзематизації. Захворювання печінки та нирок з порушенням функції.

**Особливості застосування.** Для застосування в період вагітності та годування груддю потрібна консультація лікаря. Засіб можна застосовувати дітям після консультації з лікарем. Не допускати потрапляння засобу на слизові оболонки очей. При потраплянні розчину в очі слід промити їх великою кількістю води.

**Спосіб застосування.** Водний розчин готувати безпосередньо перед застосуванням. Для приготування водного розчину Сангвірісепт розвести в 40 разів (1 чайна ложка на 200 мл теплої кип'яченої води). Засіб застосовувати зовнішньо та місцево.

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 50 мл (ml) у флаконі; по 1 флакону в пачці.

**Виробник.** ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика». Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський район, с. Станишівка, вул. Корольова, буд. 4. тел.: +380 (412) 48-11-31. e-mail: [pharmfactory@vishpha.ua](mailto:pharmfactory@vishpha.ua)

**Заявник.** ТОВ «МІТЕК» 03057, м. Київ, вул. Металістів, 16, тел.: +38 (044) 495 29 29  
[www.mitek.kiev.ua](http://www.mitek.kiev.ua)

ТУ У 20.2-23153491-001:2021